



FODER



BRØD

HYBRIDRUG

UDBYTTEPOTENTIALE

Lavt				Højt
------	--	--	--	------

HEKTOLITER VÆGT

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

SKOLDPLET

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----



EGENSKABER

- Højt udbyttepotentiale
- Høj vinterfasthed
- Middellangt strå
- Middeltendens til lejesæd
- Besidder PollenPlus

FORÆDLER:



FAKTA

År	Kerne-udbytte*	Kerne-udbytte**	Protein-udbytte*	Protein-udbytte**	Foderværdi (Fesv pr. hkg)	Observationsparceller			
						Meldug (%)	Brunrust (%)	Skoldplet (%)	Strå længde (cm)
2018	104	-	754	-	111,2	-	16	7	117
2017	-	104	-	927	-	0,4**	6**	4,1**	141**
2016	-	105	-	921	-	0**	0**	3,2**	135**

*Landsforsøg. **Lovbestemt værdiafprøvning.

Kilde: Landsforsøg.

PLANTEVÆRN

Vækststadium	St. 29-31	St. 32	St. 39-45	St. 69
Svampesygdomme		Ved angreb af meldug, skoldplet og/eller brunrust: Anvend 25% normaldosering af en bredspektret løsning	Anvend 40-50% normaldosering af en stærk løsning mod brunrust, f.eks. 0,4 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro	Hvis brunrust ved afsluttet blomstring: Anvend 0,2-0,25 l Orius. Senest st. 69, men kød aldrig i afgrøden under blomstring.
Vækstregulering*	0,5 l CCC + 0,2 l Moddus M. eller anvend løsning i st. 32.	0,3-0,4 l Moddus M	Ved højt N-niveau og kraftige afgrøder: Suppler med 0,2 l Moddus M + 0,2 l Cerone	
Skadedyr			Ved mere end 0,5-1 trips pr. bladskede: Anvend 0,15 kg Karate 2,5WG eller 0,1 l Mavrik Vita.	

* Husk ingen vækstregulering i brødrug, og vækstreguler aldrig stressede afgrøder

PAKNING

Vinterrug hybrider	
Bigbags	Vinterrug hybrider sælges i bigbags med 12 millioner kerner (12 units pr. BB)

Udviklingsstadier

