

SORTIMENT TIL PLIGTIGE-, HUSDYR- OG MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER (IKKE TIL MFO EFTERAFGRØDE)

ATLANTIS

DOBBELT NEMATODERESISTENT OLIERÆDDIKE

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT FLERE NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Høj reduktionseffekt af roecyste-, rodgalle-, rodlæssions- og fritlevende nematoder
 - Hurtig og god dækkende vækst
 - Dyb rodvækst og høj kvælstofoptagelse

FAKTA

Som efterafgrøde	Atlantis olieræddike, (Dobbelt nematoderesistent)
Nematoderesistens	X
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle, inkl. roer og kartofler
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



GUILLOTINE

NEMATODERESISTENT OLIERÆDDIKE

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT ROECYSTENEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Høj reduktionseffekt af roecystenematoder
 - Hurtig og god dækkende vækst, dyb rodvækst
 - Høj kvælstofoptagelse
 - Stor bladmasse

FAKTA

Som efterafgrøde	Guillotine olieræddike, (Roecystenematoderesistent)
Nematoderesistens	X
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps, roer
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



RUTINA

OLIERÆDDIKE, STD

VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Hurtig og dækkende vækst
 - Stor bladmasse
 - Dyb rodvækst
 - Høj kvælstofoptagelse

FAKTA

Som efterafgrøde	Rutina (Olieræddike, standard)
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



SILETINA

OLIERÆDDIKE, STD

VÆKST

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

DÆKNINGSGRAD

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

REDUKTIONSEFFEKT NEMATODER

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Hurtig og dækkende vækst
 - Stor bladmasse
 - Dyb rodvækst
 - Høj kvælstofoptagelse

FAKTA

Som efterafgrøde	Siletina (Olieræddike, standard)
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15

